**Informatique en PCSI et MPSI
Champollion 2013-2014
Méthodes d'Analyse Numériques
Implémentation et Application en Python
Intégration Numérique**

A. HASSAN

23 avril 2014

Intégration Numérique (Quadrature)

Intégration Numérique (Quadrature)

L'intégration : une histoire
d'Aire

L'intégration : une
Histoire d'Aire

Introduction

**Pourquoi l'intégration
numérique?**

Le problème

Le Problème (suite)

Polynômes d'interpolation
de Lagrange

Méthodes Élémentaires de
Quadrature (de
Newton-Cotes)

(Suite)

(suite)

Méthodes d'ordre zéro:
Exemple des Rectangles
gauches

Méthodes d'ordre zéro:
Rectangles Droits

Méthodes des **Rectangles
Milieux**

Implémentation en
Python (à compléter)

Implémentation en Python

Méthode des rectangles:

Calcul de l'erreur

Rectangle des milieux:

Calcul de l'erreur

Méthode de Simpson:

L'intégration : une histoire d'Aire

Aire par Triangulation

L'intégration : une Histoire d'Aire

Le cas des contours courbés

Intégrale (de Riemann) sur un segment : f est intégrable sur $[a; b]$, ssi pour toute subdivision $\sigma_n = (\underbrace{x_0}_{=a} < x_1 < \dots < \underbrace{x_n}_{=b})$ les sommes ci-dessous convergent

$$\sum_{i=0}^{i=n-1} (x_{i+1} - x_i) f(t_i) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\forall t_i \in [x_i; x_{i+1}]} L \left(\text{noté } \int_{x=a}^{x=b} f(x) dx \right)$$

Théorème fondamental de l'Analyse :

Soit f continue sur $[a; b]$ et F une primitive de f alors :

$$\int_a^b f(t) dx = F(b) - F(a)$$

Le calcul d'une intégrale devient un calcul de primitive que l'on peut exprimer, si possible, à l'aide des fonctions élémentaires et leurs composées.

Pourquoi l'intégration numérique ?

1. **Impossibilité** d'exprimer une primitive à l'aide des fonctions usuelles :

$$\int_0^{2013} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx; \quad \int_0^{2014} e^{-x^2} dx; \quad \int_0^2 \frac{\cos(x)}{x+6} dx;$$

2. **Primitive compliquée** : coût d'évaluation élevé

$$\int_0^x \frac{1}{1+t^4} dt = \frac{\sqrt{2}}{8} \ln \left(\frac{x^2 + x\sqrt{2} + 1}{x^2 - x\sqrt{2} + 1} \right) + \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\arctan(x\sqrt{2} + 1) + \arctan(x\sqrt{2} - 1) \right]$$

3. **Expression analytique de f non disponible** : f est donnée sous forme d'une table de valeurs i.e. $(x_i; f(x_i))$ (Exemple : mesures physiques).

Intégration Numérique
(Quadrature)

L'intégration : une histoire
d'Aire

L'intégration : une
Histoire d'Aire

Introduction

**Pourquoi l'intégration
numérique?**

Le problème

Le Problème (suite)

Polynômes d'interpolation
de Lagrange

Méthodes Élémentaires de
Quadrature (de
Newton-Cotes)

(Suite)

(suite)

Méthodes d'ordre zéro:
Exemple des Rectangles
gauches

Méthodes d'ordre zéro:
Rectangles Droits

Méthodes des **Rectangles
Milieux**

Implémentation en
Python (à compléter)

Implémentation en Python

Méthode des rectangles:
Calcul de l'erreur

Rectangle des milieux:
Calcul de l'erreur

Méthode des Milieux

Données : En général on dispose des valeurs (abscisses) $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ (subdivision) dans $[a; b]$ et leurs images $(f(x_i))_{1 \leq i \leq n}$

Deux méthodes principales :

1. **Subdivision régulière** de $[a; b] \Rightarrow x_i = x_{i-1} + h = a + h.i$
où $h = (b - a)/n$
2. **À la Gauss :** les points de la subdivision sont fixés à l'avance : Racines de famille orthogonale de polynômes.

Intégration Numérique
(Quadrature)

L'intégration : une histoire
d'Aire

L'intégration : une
Histoire d'Aire

Introduction
**Pourquoi l'intégration
numérique?**

Le problème

Le Problème (suite)

Polynômes d'interpolation
de Lagrange

Méthodes Élémentaires de
Quadrature (de
Newton-Cotes)

(Suite)

(suite)

Méthodes d'ordre zéro:
Exemple des Rectangles
gauches

Méthodes d'ordre zéro:
Rectangles Droits

Méthodes des **Rectangles
Milieux**

Implémentation en
Python (à compléter)

Implémentation en Python

Méthode des rectangles:
Calcul de l'erreur

Rectangle des milieux:
Calcul de l'erreur

Méthode de Simpson

Soit $I = [a; b]$ et f une fonction définie sur I , on cherche à évaluer

numériquement : $I(f) = \int_a^b f(t) dt$

Soit $T = (\underbrace{x_0}_{=a} < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < \underbrace{x_n}_{=b})$ une subdivision (pas

nécessairement régulière) de $I = [a; b]$

On suppose les valeurs de $f(x_i)$ connues

Problème : Trouver $(\omega_i)_{0 \leq i \leq n}$ tels que $I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx S = \sum_{i=0}^{i=n} \omega_i f(x_i)$

Trouver $(\omega_i)_{0 \leq i \leq n}$ les **coefficients de pondération** qui minimisent

$$\left| I(f) - \sum_{i=0}^{i=n} \omega_i f(x_i) \right| ?$$

Polynômes d'interpolation de Lagrange

Soit les $n + 1$ points $(x_k, f(x_k))_{0 \leq k \leq n}$ tels que : $x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n$

Trouver $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $P(x_k) = f(x_k)$ pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$?.

Une solution(polynômes de Lagrange) :

$$L_k(X) = \frac{\prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ k \neq j}} (X - x_j)}{\prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ k \neq j}} (x_k - x_j)} \quad \Rightarrow \quad L_k(x_i) = \delta_{ki} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Les $(L_k)_{1 \leq k \leq n}$ forment une base de $\mathbb{K}_n[X]$ (le démontrer ??),

$$P(X) = f(x_0).L_0(X) + f_1(x_1).L_1(X) + \dots + f(x_n).L_n(X) = \sum_{k=0}^{k=n} f(x_k).L_k(X)$$

est LE polynôme interpolant f aux points $(x_k; f(x_k))_{0 \leq k \leq n}$

Méthodes Élémentaires de Quadrature (de Newton-Cotes)

Sur un **intervalle élémentaire** $[x_i; x_{i+1}]$, la fonction f est **remplacée** par un polynôme interpolateur P_n de degré n .

La méthode renvoie **un résultat exact** si f est un polynôme de degré n .

On pose $x_{i+1} - x_i = h = \frac{b-a}{N}$ (pas régulier)

Définition : Une méthode d'intégration est dite d'ordre n , si elle renvoie un résultat exact pour tout $f \in \mathbb{R}_n[X]$ et non exact pour un élément de $\mathbb{R}_{n+1}[X]$.

Voici les plus célèbres :

Méthode des rectangles où le Polynôme interpolateur est **constant**

$P_0(x) = f(x_i)$ Rectangles gauches Ordre 0

$P_0(x) = f(x_{i+1})$ Rectangles droits Ordre 0

$P_0(x) = f\left(\frac{1}{2}(x_i + x_{i+1})\right)$, Rectangles milieux Ordre 1

Remarque : Ces méthodes font référence aux **sommes de Riemann**.

Méthode d'ordre 1, ou des trapèzes :

Polynôme interpolateur de degré 1 (droite affine)

$$\begin{aligned} P_1(x) &= \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} f(x_i) + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} f(x_{i+1}) \\ &= \frac{1}{h} [(x - x_i) f(x_{i+1}) - (x - x_{i+1}) f(x_i)] \\ &= \frac{1}{h} [(x - x_i) y_{i+1} - (x - x_{i+1}) y_i] \end{aligned}$$

On verra que cette méthode est d'ordre 1, i.e. elle est exacte pour les fonctions affines (polynômes de degré 1)

Méthode d'ordre 2, ou de SIMPSON :

Polynôme interpolateur de degré 2 (parabole). On interpole les points $(x_i, f(x_i))$, $(x_{i+1}; f(x_{i+1}))$ et $(x_{i+2}; f(x_{i+2}))$

$$P_2(x) = \frac{(x - x_{i+2})(x - x_{i+1})}{(x_i - x_{i+1})(x_i - x_{i+2})} f(x_i) + \frac{(x - x_i)(x - x_{i+2})}{(x_{i+1} - x_i)(x_{i+1} - x_{i+2})} f(x_{i+1})$$

$$+ \frac{(x - x_i)(x - x_{i+1})}{(x_{i+2} - x_i)(x_{i+2} - x_{i+1})} f(x_{i+2})$$

$$P_2(x) = \frac{(x - x_{i+2})(x - x_{i+1})}{h^2} y_i - \frac{(x - x_i)(x - x_{i+2})}{h^2} y_{i+1}$$

$$+ \frac{(x - x_i)(x - x_{i+1})}{2h^2} y_{i+2}$$

Remarque : D'autres approches interpolent les points d'abscisses x_i , x_{i+1} et leur milieu $\frac{1}{2}(x_i + x_{i+1})$

Cette méthode est exacte pour les polynômes de degré 2.

Méthodes d'ordre n ou de Newton-Cotes : On utilise un polynôme interpolateur de degré n.

Méthodes d'ordre zéro : Exemple des Rectangles gauches

Le polynôme interpolateur est constant $L_0(X)|_{[x_i; x_{i+1}]} = f(x_i) = y_i$

Intervalle élémentaire : $I_e = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(t) dt \approx \int_{x_i}^{x_{i+1}} P_0(t) dt \approx (x_{i+1} - x_i)f(x_i)$ (i.e. évaluation de f à gauche).

$$\text{Il vient : } I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx S_R = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i)f(x_i) = h \sum_{i=0}^{n-1} y_i$$

Méthodes d'ordre zéro : Rectangles Droits

Le polynôme interpolateur est constant $P_0(X)|_{[x_i; x_{i+1}]} = f(x_{i+1}) = y_{i+1}$

Intervalle élémentaire : $\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(t) dt \approx (x_{i+1} - x_i)f(x_{i+1})$ (i.e. évaluation de f à gauche).

$$\text{Il vient : } \int_a^b f(t) dt \approx \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} P_0(t) dt = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i)f(x_{i+1}) = h \sum_{i=0}^{n-1} y_{i+1}$$

Méthodes des Rectangles Milieu

Le polynôme interpolateur est toujours constant

$$P_0(X)|_{[x_i; x_{i+1}]} = \frac{1}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})]$$

Intervalle élémentaire $\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(t) dt \approx (x_{i+1} - x_i) f\left(\frac{1}{2}(x_i + x_{i+1})\right)$

$$\int_a^b f(t) dt \approx \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) f\left(\frac{1}{2}(x_i + x_{i+1})\right) = h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$$

Implémentation en Python (à compléter)

Rectangles Gauches :

```
1 def LeftBox(f, a, b, N):  
2     s, x, h = 0, a, (b-a)/n  
3     .....  
4     .....  
5     .....  
6     .....  
7     return s
```

Rectangles Droits :

```
1 def RightBox(f, a, b, n):  
2     s, x, h = .....  
3     .....  
4     .....  
5     .....  
6     .....  
7     return s
```

Rectangles des Milieux :

```
1 def MiddleBox(f, a, b, n):  
2     s, x, h = 0, a, (b-a)/n  
3     .....  
4     .....  
5     .....  
6     .....  
7     .....  
8     return s
```

Intégration Numérique
(Quadrature)

L'intégration : une histoire
d'Aire

L'intégration : une
Histoire d'Aire

Introduction

**Pourquoi l'intégration
numérique?**

Le problème

Le Problème (suite)

Polynômes d'interpolation
de Lagrange

Méthodes Élémentaires de
Quadrature (de
Newton-Cotes)

(Suite)

(suite)

Méthodes d'ordre zéro:
Exemple des Rectangles
gauches

Méthodes d'ordre zéro:
Rectangles Droits

Méthodes des **Rectangles
Milieux**

Implémentation en
Python (à compléter)

Implémentation en Python

Méthode des rectangles:

Calcul de l'erreur

Rectangle des milieux:

Calcul de l'erreur

Méthode des Milieux:

Rectangle Gauches

```
1 def LeftBox(f, a, b, N):
2     s, x, h = 0, a, (b-a)/n
3     for k in range(n):
4         s += h*f(x)
5         x += h
6     return s
```

Rectangles des Milieux

```
1 def MiddleBox(f, a, b, n):
2     s, x, h = 0, a, (b-a)/n
3     for k in range(n):
4         s += h*f(x+h/2)
5         x += h
6     return s
```

Rectangles Droits

```
1 def RightBox(f, a, b, n):
2     s, x, h = 0, a, (b-a)/n
3     for k in range(n):
4         x += h
5         s += h*f(x)
6     return s
```

Intégration Numérique
(Quadrature)

L'intégration : une histoire
d'Aire

L'intégration : une
Histoire d'Aire

Introduction

**Pourquoi l'intégration
numérique?**

Le problème

Le Problème (suite)

Polynômes d'interpolation
de Lagrange

Méthodes Élémentaires de
Quadrature (de
Newton-Cotes)

(Suite)

(suite)

Méthodes d'ordre zéro:
Exemple des Rectangles
gauches

Méthodes d'ordre zéro:
Rectangles Droits

Méthodes des **Rectangles
Milieux**

Implémentation en
Python (à compléter)

Implémentation en Python

Méthode des rectangles:
Calcul de l'erreur

Rectangle des milieux:

Calcul de l'erreur

Méthodes Numériques

Méthode des rectangles : Calcul de l'erreur

Sur l'intervalle $I_{e_i} = [x_i; x_{i+1}]$

$$f(x) - y_i = f'(c_i)(x - x_i) \Rightarrow \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx - hy_i = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f'(c_i)(x - x_i) dx$$

Si f' bornée i.e. $\exists M = \sup_{c \in [a; b]} |f'(c)|$

$$\left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx - hy_i \right| \leq M \frac{1}{2} (x_{i+1} - x_i)^2 = M \frac{(b-a)^2}{2n^2}$$

$$\text{En sommant } \left| \int_a^b f(x) dx - h \sum_{i=0}^{n-1} y_i \right| \leq M \frac{(b-a)^2}{2n}$$

Pour une précision de ε on prend $n > M \frac{(b-a)^2}{2\varepsilon}$

Remarque : La méthode des rectangles-milieu est d'ordre 1.

Rectangle des milieux : Calcul de l'erreur

Preuve : Par DL₂ au voisinage du point milieu $x_i + \frac{h}{2}$ et $\forall t \in I_i = [x_i; x_i + h]$, $\exists c_i \in I_i$ tel que

$$f(t) = f\left(x_i + \frac{h}{2}\right) + \left(t - x_i - \frac{h}{2}\right)f'\left(x_i + \frac{h}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(t - x_i - \frac{h}{2}\right)^2 f''(c_i)$$

$$\int_{x_i}^{x_i+h} f(t) dt - hf\left(x_i + \frac{h}{2}\right) = \int_{x_i}^{x_i+h} \left(t - x_i - \frac{h}{2}\right)f'\left(x_i + \frac{h}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(t - x_i - \frac{h}{2}\right)^2 f''(c_i) dt$$

$$\xrightarrow[u=t-x_i-\frac{1}{2}h]{\text{chang. var}} \int_{x_i}^{x_i+h} \left(t - x_i - \frac{h}{2}\right) dt = \int_{-\frac{1}{2}h}^{\frac{1}{2}h} u du = 0 \text{ et si } \sup_{x \in [a;b]} |f''(x)| \leq M$$

$$\left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx - hf\left(x_i + \frac{h}{2}\right) \right| \leq \frac{M}{3} h^3$$

$$\text{Par sommation : } \left| \int_a^b f(x) dx - h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right) \right| \leq \frac{M}{3} \times nh^3 = M \frac{(b-a)^3}{3n^2}$$

Méthodes d'ordre un : méthode des Trapèzes

$$I_e = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(t) dt \approx (x_{i+1} - x_i) \frac{1}{2} \cdot (y_i + y_{i+1}) = \frac{h}{2} (y_i + y_{i+1})$$

$$\int_a^b f(t) dt \approx S = \frac{h}{2} [(y_0 + y_1) + (y_1 + y_2) + \cdots + (y_{n-1} + y_n)]$$

$$S = h \left[-\frac{1}{2}(y_0 + y_n) + \sum_0^n y_i \right] \Rightarrow S = \frac{h}{2} \left[\frac{1}{2}(y_0 + y_n) + \sum_1^{n-1} y_i \right]$$

Méthode des Trapèzes : Calcul de l'erreur

Théorème : Si f est $\mathcal{C}^2$ telle que $\sup |f''(t)| < M$ alors $|I(f) - S| \leq M \frac{(b-a)^3}{12n^2}$

Preuve : Soit $[x_i; x_{i+1}] = [x_i; x_i + h]$, $L_2(x) = \frac{1}{h} [(x - x_i)y_{i+1} - (x - x_{i+1})y_i]$

$$\begin{cases} \varphi(t) = f(t) - \frac{1}{2}M(t - x_i)(x_{i+1} - t) \Rightarrow \varphi''(t) = f''(t) + M \geq 0 \Rightarrow \varphi \text{ convexe} \\ \psi(t) = f(t) - \frac{1}{2}M(t - x_i)(x_{i+1} - t) \Rightarrow \psi \text{ est concave} \end{cases}$$

φ en dessous de L_2 et ψ en dessus

$$f(t) + \frac{1}{2}M(t - x_i)(x_{i+1} - t) \leq L_2 < f(t) - \frac{1}{2}M(t - x_i)(x_{i+1} - t) \xleftrightarrow{t \in [x_i; x_{i+1}]}$$

$$|f(t) - L_2(t)| \leq \frac{1}{2}M(t - x_i)(x_{i+1} - t) \xrightarrow[\text{intégration}]{\text{par}} \left| \int_{x_i}^{x_i+h} f(t) - L_2(t) dt \right| \leq \frac{M}{12}(x_{i+1} - x_i)^3$$

$$\text{En sommant : } \left| \int_{x=a}^{x=b} f(x) dx \right| \leq \sum_{i=0}^{i=n-1} \frac{M}{12} \underbrace{(x_{i+1} - x_i)^3}_{=h=\frac{1}{n}(b-a)} \Rightarrow |I(f) - S| \leq \frac{M}{12n^2}(b-a)^3$$

Méthode d'ordre 2 : SIMPSON

$$L_2(x) = \frac{(x - x_{i+1})(x - x_{i+2})}{h^2} y_i + \frac{(x - x_i)(x - x_{i+2})}{(-h^2)} y_{i+1} + \frac{(x - x_i)(x - x_{i+1})}{2h^2} y_{i+2}$$

Intégrale élémentaire :

$$I_e = \int_{x_i}^{x_{i+2}} f(x) dx \approx \int_{x_i}^{x_{i+2}} L_2(x) dx$$

$$I \approx \sum ()$$

Méthode Simpson : Démonstration

Preuve : Soit $[x_i; x_{i+2}]$ tel que
$$\begin{cases} \deg(L_2) = 2 \\ y_i = f(x_i) = L_2(x_i) \\ y_{i+1} = f(x_{i+1}) = L_2(x_{i+1}) \\ y_{i+2} = f(x_{i+2}) = L_2(x_{i+2}) \end{cases}$$

$$I_e = \int_{x_i}^{x_{i+2}} f(x) dx \approx \int_{x_i}^{x_{i+2}} L_2(x) dx$$

Par un changement de variable $t = x_i - h$ on se ramène à

$$I \approx \int_{-h}^h (at^2 + bt + c) dt \text{ avec } \begin{cases} y_i = ah^2 - bh + c \\ y_{i+1} = c \\ y_{i+2} = ah^2 + bh + c \end{cases} .$$

$$\xrightarrow[\text{Parité}]{\text{Par}} I_e \approx 2 \int_{t=0}^h at^2 + c dt = \frac{2}{3}a.h^3 + 2ch$$

Méthode de Simpson : (Suite)

$$I_e \approx \frac{h}{3} (2ah^2 + 6c) \xrightarrow[\substack{y_i + y_{i+2} = 2ah^2 + 2c \\ y_i + y_{i+2} = 2ah^2 + 2y_{i+1}}]{y_i + y_{i+2} = 2ah^2 + 2c} I_e \approx \frac{h}{3} (y_i + 4y_{i+1} + y_{i+2})$$

Il vient :

$$S = \frac{h}{3} [y_0 + 4y_1 + y_2 \\ + y_2 + 4y_3 + y_4 \\ + y_4 + 4y_5 + y_6 \\ + \vdots + \vdots + \vdots \\ + y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n}]$$

Avec un nombre pair de subdivisions, $h = \frac{b-a}{2n}$:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[y_{2n} - y_0 + \sum_{i=0}^{n-1} 2y_{2i} + 4y_{2i+1} \right]$$

Mise en œuvre de la méthode de SIMPSON(à compléter)

On choisit un nombre pair d'intervalles $\Rightarrow h = \frac{(b-a)}{2n}$ (donc $2n + 1$ points).

SINON : l'interpolation est faite sur les points : x_i ; $m_i = \frac{1}{2}(x_i + x_{i+1})$ et x_{i+1} et

$$I_e = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(t) dt \approx \frac{h}{6}(y_i + 4f(m_i) + y_{i+1})$$

```
1 ##
2 def Simpson(f,a,b,n):
3     n2=2*n           # nombre pair de points
4     s,h=0,(b-a)/n2  # initialisation
5     x1=a            # abscisses d'ordre pair
6     for :::::::::::
7         .....
8         .....
9     .....
10    .....
11    .....
12    return s*h/3
```

Mise en œuvre de la méthode de SIMPSON

On choisit un nombre pair d'intervalles $\Rightarrow h = \frac{(b-a)}{2n}$ (donc $2n + 1$ points).

SINON : l'interpolation est faite sur les points : x_i ; $m_i = \frac{1}{2}(x_i + x_{i+1})$ et x_{i+1} et

$$I_e = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(t) dt \approx \frac{h}{6} (y_i + 4f(m_i) + y_{i+1})$$

```
1 ##
2 def Simpson(f,a,b,n):
3     n2=2*n           # nombre pair de points
4     s,h=0,(b-a)/n2  # initialisation
5     x1=a            # abscisses d'ordre pair
6     for i in range(0,n):
7         s += 2*f(x1)+4*f(x1+h)
8         x1=x1+2*h
9     s += f(b)-f(a)
10    return s*h/3
```

Erreur de la méthode de Simpson, méthodes de Newton-Cotes

Théorème[admis] : Si la dérivée d'ordre 4 de f vérifie $\sup_{x \in [a;b]} |f^{(4)}(x)| \leq M$ alors

$$|I(f) - S_p| \leq M \frac{(b-a)^5}{n^4} \text{ avec } h = \frac{b-a}{n}$$

Les méthodes précédentes font partie des méthodes de **Newton-Cotes**, où l'on **interpole** $n + 1$ **points** par un **polynôme de degré** n .

1. Newton-Cotes d'ordre 1 $\iff$ Méthode des trapèzes
2. Newton-Cotes d'ordre 2 $\iff$ Méthode Simpson
3. On montre que, selon la parité de n :
 n **pair** $\Rightarrow$ Résultat exact dans $\mathbb{R}_{n+1}[X]$, n **impair** $\Rightarrow$ Résultat exact dans $\mathbb{R}_n[X]$
Ainsi la méthode de **Simpson** (i.e. $n = 2$) est **exacte pour des polynômes de degré 3**

Exemple : pour $n = 4$, i.e. 4 points d'interpolations et donc 3 subdivisions (avec

$h = x_{i+1} - x_i$ et $x_i < c < x_{i+3}$) :

$$\int_{x_i}^{x_{i+3}} f(t) dt = \frac{3}{8} h [f(x_i) + 3f(x_{i+1}) + 3f(x_{i+2}) + f(x_{i+3})] + \underbrace{E(h)}_{=-3h^5 \cdot f^{(4)}(c) / 80} \text{ avec } E(h) \leq M \cdot h^5$$

Comparaison des méthodes

```
1 ##
2 def f(x):
3     #  $x \mapsto \pi x \sin(2\pi x)$ 
4     return np.pi*x*np.sin(2*np.pi*x)
5 #-----
6 # fonction definies a la volee :
7 #-----
8 fc=lambda x:1           # (  $x \mapsto 1$  )
9 fa=lambda x:x           # (  $x \mapsto x$  )
10 fq=lambda x:x**2       # (  $x \mapsto x^2$  )
11 fcub=lambda x:x**3     # (  $x \mapsto x^3$  )
12 ft=lambda x:x**(-0.5)  # (  $x \mapsto 1/\sqrt{x}$  )
13 #
```

```
1 a,b=0,1           # intervalle d'integration [0,1]
2 # Valeur exacte  $\int_0^1 1 dx = 1$ 
3 cl=LeftBox(fc,a,b,100)
4 cr=RightBox(fc,a,b,100)
5 cm=MiddleBox(fc,a,b,100)
6 ct=Trapeze(fc,a,b,100)
7 cs=Simpson(fc,a,b,50)
8 cq=spi.quad(fc,a,b)
9 # commande de Python
10 print("----_fonction_CONSTANTE_----")
11 print("LeftBox=%5.5f,_RightBox=%5.5f"%(cl,cr));
12 print("Middle=%5.5f,_Trapeze=%5.5f"%(cm,ct))
13 print("Simpson=%5.5f,_Quad=%5.5f"%(cs,cq[0]))
```

On considère $n = 100$ subdivisions de l'intervalle $[0, 1]$

On a utilisé la commande `quad(f, a, b)` du module `scipy.integrate`

Intégrales	Rect. Gauches	Rect. Droits	Rect. Mil.	Trapèzes	Simpson	Python quad	Val. Exact.
$\int_0^1 1 \, dx$	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
$\int_0^1 x \, dx$	0.49500	0.50500	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	1/2
$\int_0^1 x^2 \, dx$	0.32835	0.33835	0.333325	0.33335	0.3333	0.3333	1/3
$\int_0^1 x^3 \, dx$	0.24502	0.25502	0.24998	0.250025	0.2500	0.2500	1/4
$\int_0^1 \pi x \sin(2\pi x) \, dx$	-0.49984	-0.49984	-0.50009	-0.49984	-0.50001	-0.500	-1/2
$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$	2.84757	1.85767	1.93715	2.35262	2.20601	2.000	2

Erreurs d'intégration : Tableau comparatif

Définition : On dit que $f = O_a(g)$ (ou O_a), f est "*grand Oh*" de g au voisinage de a , ssi il existe $K > 0$ tel que

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in V : |f(x)| \leq K|g(x)|$$

Notons n le nombre de subdivisions de $[a; b]$ (donc $h = \frac{b-a}{n}$)

Méthode	Erreur
Rectangles Gauches (ou Droits)	$O_{+\infty}\left(\frac{1}{n}\right)$
Rectangles Milieux	$O_{+\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right)$
Trapèzes	$O_{+\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right)$
Simpson	$O_{+\infty}\left(\frac{1}{n^4}\right)$

L'instruction `quad` du module `scipy.integrate`

Syntaxe : forme simplifiée :

```
from scipy.integrate import quad
```

```
s=quad(func, a, b)
```

func : Fonction à intégrer

a : borne inférieure de l'intégrale

b : borne supérieure de l'intégrale

Elle renvoie `s[0]` valeur approchée l'intégrale et `s[1]` : une estimation de l'erreur

Pour une syntaxe plus complète, faire `help(quad)`

Exemples :

```
1 from scipy.integrate import quad
2 f=lambda x: x**2 # f: x ↦ x2
3 s,err=quad(f,0,6)# s = ∫06 x2dx
4 >>> print(s)
5 72.000000000000001# val. exacte 72
6 >>> print(err)
7 7.993605777301129e-13
```

```
1 # definition de la fonction a la volée
2 ff=lambda x:np.exp(-x**2)# i.e. x ↦ e-x2/2
3 # utilisation de quad
4 s,err=quad(ff,-10,10)# ≈ ∫-∞∞ e-x2dx
5 >>> s # val theorique √π
6 1.772453850905516
7 >>> err # erreur
8 3.696676120408319e-13
9 >>> (np.pi)**(0.5)# √π
10 1.7724538509055159
```

Exemple : Période du pendule simple

Déterminer l'expression de la période d'un pendule simple en fonction de θ_0 l'angle initial.

Solution :

$$\frac{1}{2}mv^2 - mgh = 0 - mgh_0 = \text{const (conservation de l'énergie)} \xrightarrow[\substack{v=L\theta' \\ h=L\cos(\theta)}]$$

$$\frac{1}{2}mL^2\theta'^2 - mgL\cos(\theta) = 0 - mgL\cos(\theta_0) \Rightarrow \theta'^2 = \frac{2g}{L}(\cos(\theta) - \cos(\theta_0))$$

Par radical : $\frac{-\theta'}{\sqrt{\cos(\theta) - \cos(\theta_0)}} = \sqrt{\frac{2g}{L}}$ Attention au signe (-) : variations θ et θ' opposées

Intégration de $t = 0$ à $t = T/4$ avec $\theta(0) = \theta_0$ et $\theta(T/4) = 0 \Rightarrow$

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{2g}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos(\theta) - \cos(\theta_0)}} \quad \text{Angle moitié : } \cos(\theta) = 1 - 2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$\Rightarrow$

$$T = 2\sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2\left(\frac{\theta_0}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}} \xrightarrow[\text{chang. var}]{\sin(u) = \frac{\sin(\theta/2)}{\sin(\theta_0/2)}} T = 4\sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{\sqrt{1 - \sin^2\left(\frac{\theta_0}{2}\right) \sin^2(u)}}$$

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}} \cdot K\left(\sin\left(\frac{\theta_0}{2}\right)\right) \quad \text{où } K(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{\sqrt{1 - x^2 \sin^2(u)}}$$

La fonction $x \mapsto K(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{\sqrt{1-x^2 \sin^2(u)}}$, s'appelle fonction **intégrale elliptique**, elle ne peut s'exprimer à l'aide des fonctions usuelles (sinon on l'aurait su).

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{\sqrt{1 - \sin^2(\frac{\theta_0}{2}) \sin^2(u)}} = \frac{2}{\pi} T_0 \cdot K(\sin(\theta_0/2))$$

Quelques approximations :

(•) $\theta_0 \approx 0 \Rightarrow T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ (formule connue)

(•) θ_0 petit $\xrightarrow[(1+u)^\alpha \approx 1+\alpha u]{DL}$ $(1 - \sin^2(\theta_0/2) \sin^2(u))^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{1}{2} \underbrace{\sin^2(\theta_0/2)}_{\frac{1}{2}\theta_0^2} \sin^2(u)$

$\xrightarrow[\text{avec } \int_0^{\pi/2} \sin^2(u) du = \frac{\pi}{4}]{\text{En intégrant}}$ $T \approx T_0(1 + \frac{1}{16}\theta_0^2)$ [Formule de Bordas]

Implémentation en Python et comparaison

```
1 #
2 import numpy as np
3 import scipy.integrate as spi
4 import matplotlib.pyplot as mp
5 #-----
6 def fellip(x,u):#x ↦ 1/√(1-u².sin²(x))
7     return 1/np.sqrt(1-u**2*(np.sin(x))**2)
8 #
9 t=np.linspace(0.01,1.57,20)
10 nt=len(t)
11 y=[]
12 yellip=[]
13 for tg in t:
14     s=2*spi.quad(f,0,tg,args=(tg,))[0]/np.sqrt(2)/np.pi
15     u=np.sin(tg/2)
16     sellip=2*spi.quad(fellip,0,np.pi/2,args=(u,))[0]/np.pi
17     y.append(s)
18     yellip.append(sellip)
19 #
20 fig=mp.figure()
21 mp.draw()
22 mp.axis([0.,1.7,0.8,1.3])
23 mp.plot(t,yellip,'g',t,(1+t**2/16),'or')
24 mp.title("Comparaison")
25 mp.xlabel("Angle_initial")
26 mp.ylabel("Période_T")
27 mp.legend(["Exact","approch."])
28 mp.grid()
29 mp.show()
```

Courbe de $T(\theta_0) = \frac{2}{\pi} T_0 K(\sin(\theta_0/2))$ et $T_a(\theta_0) = T_0(1 + \frac{\theta_0^2}{16})$ (en pointillé)