

REVISIONS DE 1^{ère} ANNEE

+ BM 4 : Structure moléculaire et propriétés des protéines (formulaire à disposition) = IV de BC2 des sup2

- * Les acides aminés sont des petites molécules azotées : Structure et propriétés de base constantes / diversité liée aux chaînes latérales
- * La structure primaire d'une protéine est l'assemblage covalent de ses acides aminés : polymérisation des acides aminés ; origine génétique; formation de polymères linéaires, orientés, séquencés, chargés; la stl conditionne la structure spatiale (ex de la drépanocytose)
- * La structure secondaire d'une protéine correspond à des conformations géométriques locales : des segments s'organisent en motifs réguliers : hélices α et feuillettes β ; liaisons impliquées : les liaisons H. L'importance fonctionnelle est souvent indirecte : propriétés mécaniques des protéines fibrillaires / exposition des chaînes latérales des protéines globulaires (dont profil d'hydrophobie)
- * La structure tertiaire d'une protéine correspond à son repliement total : les liaisons se font entre les radicaux ; le repliement est plus ou moins spontané (rôle des chaperonnes) et individualise des domaines ; la dénaturation est la rupture de la structure spatiale. La structure tertiaire est essentielle à la fonction des protéines : la structure tertiaire met en place des sites fonctionnels, permet spécificité et affinité (notion de constante de dissociation enfin au programme !), autorise les changements de conformation
- * La structure quaternaire d'une protéine est pluricaténaire : un protomère est une chaîne d'acides aminés. Les protéines allostériques présentent une coopération fonctionnelle de leurs protomères ; la transition allostérique est un phénomène coopératif (ex de la PFK). Les protéines allostériques sont contrôlables par des effecteurs (ex de la PFK, contrôle par ATP et ADP).

+ MC 4 : Le devenir cellulaire de la matière organique = BE3 des sup2

- * La matière organique peut être oxydée partiellement dans le cytosol : La glycolyse, voie catabolique universelle; les voies fermentaires réoxydent partiellement la MO, et permettent de recycler les coenzymes (ex de fermentation lactique ; fermentation éthanologique juste citée)
- * La matière organique est totalement oxydée dans la matrice mitochondriale : Les voies cataboliques convergent vers l'acétylCoA : dégradation du pyruvate, des acides gras, des acides aminés. Le groupement acétyl est dégradé dans le cycle de Krebs
- * La phosphorylation oxydative fournit de l'ATP à toute la cellule : rôle de la chaîne respiratoire, et de l'ATP synthétase.
- * bilan énergétique : Fermentation et respiration ont des rendements très différents. Un acide gras fournit plus d'ATP qu'un ose
- * La matière organique peut être stockée pour constituer des réserves : Les réserves sont souvent glucidiques : le stockage se fait sous forme d'amidon chez les angiospermes et sous forme de glycogène ou de lipides chez les animaux (succinct). Le stockage et le déstockage dépendent de voies enzymatiques contrôlées : la glycogène synthase fabrique le glycogène et la glycogène phosphorylase le dégrade
- * La matière organique peut servir de briques élémentaires pour l'anabolisme : Les petites molécules du vivant dérivent souvent d'intermédiaires métaboliques : la synthèse des acides gras met en jeu l'acétylCoA ; la synthèse de certains acides aminés se fait par transamination. Les petites molécules ont des devenirs divers : les phospholipides membranaires sont fabriqués dans le REL ; les oses sont assemblés en molécules souvent exportées ; les protéines sont synthétisées lors de la traduction et les acides nucléiques lors de la réplication et transcription (vue d'ensemble).

REVISIONS DE 2^{de} ANNEE

+ L'intégration de la fonction cardio-vasculaire

- * la pression artérielle est un paramètre réglé : mise en évidence d'une régulation de la PA autour d'une valeur de consigne; mev des organes effecteurs (démonstration par loi de Poiseuille appliquée à la circulation générale); construction de la boucle de régulation de la PA : mise en évidence des capteurs détectant un écart à la valeur de consigne, codage du MN afférent, rôle du SNC (centres cardio-vasculaires) dans la production de MN efférents "adaptés", conséquence sur les organes effecteurs, et retour à la valeur de consigne; rôle de l'adrénaline (rapide) en cas d'hypotension; généralisation = notion de boucle de régulation
- * l'ajustement de la fonction CV aux besoins des organes en activité (attention : le seul exemple du programme est l'effort physique) : étude comparative des débits locaux et cardiaques au repos / à l'effort, et conséquences sur la PA; l'origine des réponses CV adaptées : commande nerveuse et hormonale; commande locale par paracrine (par métabolites produits par les cellules en activité, par NO produit par les artérioles en réponse à l'hypoxie; par bradykinine produite suite à l'émission de sueur au niveau de la peau); rôle du retour veineux. Construction de la boucle de régulation conduisant à une réponse physiologique ajustée (= "adaptée") aux besoins.
- > pour les élèves : revoir les cours coeur et vaisseaux sanguins = parties sur l'organisation structurale de ces 2 types d'effecteurs, leur commande nerveuse, hormonale et paracrine;
- = comme d'habitude, une notion SE CONSTRUIT et se DEMONTE (cf notion de boucle de régulation, par exemple)***

+ DE1 = les étapes du développement embryonnaire chez les vertébrés

- * La cellule oeuf présente déjà les axes de polarité du futur individu = le gamète femelle, une cellule avec un axe de polarité A/P (pigmentation, double gradient); la fécondation détermine un second axe de polarité (DV) : les 2 rotations faisant suite à la fécondation, apparition du croissant gris; mise en place du plan de symétrie du zygote.
- * La segmentation, de la cellule oeuf à la blastula = la mise en place de micro et macromères; expression tardive des gènes zygotiques; la construction d'un embryon aux cellules interconnectées (formation du blastocoele, cohésion mécanique et informationnelle); construction de la carte des territoires présomptifs (exp des marques colorées, résultat = les territoires présomptifs sont constitués de cellules déterminées)
- * La gastrulation, de la blastula à la gastrula = elle est caractérisées par des mvts cellulaires de gde ampleur (observations externes et en coupe); les différents types de mvts : épibolie, embolie, convergence-invagination; le résultat : la formation d'un embryon triblastique.
- * la dernière étape du DE : l'organogenèse = 1. la neurulation, acquisition du TN et début de la différenciation; 2. la formation du bg caudal : mise en place des organes et des tissus selon les axes de polarité
- > pour les colleurs = les mécanismes cellulaires à l'origine des mvts ne sont plus au programme; les mécanismes de l'induction seront détaillés dans DE2
- > pour les élèves schémas à bien connaître et à orienter systématiquement

+ Une synthèse sur les Alpes : à la recherche de témoins de l'histoire d'une chaîne de collision

- * des témoins de paléomarges passives : mise en évidence de blocs basculés, informations apportées par les roches associées aux blocs basculés : informations tirées des roches sédimentaires, ante et syn-rift, des basaltes trouvés à proximité => datation du rifting, enfoncement des marges.
- * des vestiges de l'océan alpin : étude des deux unités du Chenaillet, l'unité inférieure est caractéristique des ophiolites alpines : des LOT, indiquant une dorsale lente. Caractérisation de la couverture sédimentaire associée : datation de la durée de l'expansion océanique.
- * des témoins de la fermeture de l'océan alpin et de la collision : témoins de subduction et d'obduction = témoins sédimentaires (turbidites), métamorphiques (HP, BT), l'unité supérieure du Chenaillet est atypique (pas de subduction, mais obduction) / témoins de la collision = plis, failles inverses et chevauchements; témoins métamorphiques (MP-MT non visibles dans les alpes occidentales), témoins gravimétriques et sismiques, mettant en évidence une racine crustale
- > pour les élèves, ce chapitre nécessite une bonne maîtrise des données des TP1 et TP2 Alpes. Il s'agit ici de démontrer à l'aide d'indices comment reconstituer l'histoire de la chaîne (bref raisonnez !!!!!)